

MALADIE PIEDS-MAINS-BOUCHE

TOUCHE PRINCIPALEMENT LES JEUNES ENFANTS ENTRE L'ÂGE DE 6 MOIS ET DE 4 ANS

ORIGINE

Virus coxsackie A16



PARTICULARITÉS



Incubation
3 à 6 jours



Guérison
1 semaine



été et
automne

COMPLICATIONS ⚡

Déshydratation, atteinte cardiaque, méningite.

RISQUE EMBRYO-FŒTAL

Risque d'infection cardiaque chez le fœtus



ÉVICTION SCOLAIRE
Pas obligatoire

TRAITEMENT

Pour soulager les symptômes et améliorer le confort.



PRÉVENTION



Lavage
mains



Lavage
objets souillés



Désinfection
surfaces



Gants jetables
pendant les soins



Sous-vêtements
propres



Nettoyage
litière



Partage objets
et linge

- SYMPTÔMES -

Peu d'altération de l'état général



Fièvre modérée
à sévère



Toux



Maux de
gorge



Rhinite




Troubles de
la déglutition



Troubles
digestifs

Vésicules ou cloques sur
certaines parties du corps



🕒 L'enfant est contagieux pendant l'incubation et la phase aigüe

⚠️ Transmission par la salive, les sécrétions nasales ou les selles, par contact direct (d'enfant à enfant) ou indirect (par les objets souillés).